



IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA PRÉVIA À TERAPIA COM BIFOSFONATOS PARA PREVENÇÃO DE OMAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Gabriela Gouvea Ramos
UBS Jardim Comercial – São Paulo

Eixo Temático: LT4-Saúde do adulto

Introdução

A Osteonecrose dos Maxilares Relacionada a Medicamentos (OMAM) é uma complicação severa associada ao uso de fármacos que alteram a reabsorção e o metabolismo ósseo, como os bifosfonatos (ex.: alendronato e zoledronato). Procedimentos odontológicos cirúrgicos invasivos, infecções pré-existentes e traumas locais são os principais fatores desencadeantes dessa condição. Nesse contexto, a Atenção Primária desempenha papel estratégico na identificação de fatores de risco, adequação da cavidade bucal prévia ao tratamento farmacológico e manutenção da saúde bucal e direcionamento dos casos diagnosticados para os Centros de Especialidades Odontológicas.

Objetivo

Descrever a importância da avaliação e do tratamento odontológico prévio ao início da terapia com bifosfonatos, destacando o papel da Equipe de Saúde Bucal na Atenção Básica para a prevenção da osteonecrose dos maxilares.

Métodos

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura desenvolvida a partir do levantamento de artigos científicos nas bases PubMed, BVS e SciELO. Foram analisadas publicações abordando o mecanismo de ação dos bifosfonatos, os fatores de risco bucais, as condutas preventivas e o fluxo de manejo odontológico no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Identificação de casos de OMAM e o fluxo de direcionamento para os Centros de Especialidades Odontológicas, garantindo um cuidado integral ao paciente, além do reforço com a equipe técnica sobre importância da avaliação odontológica para adequação bucal previamente à terapia com medicamentos de risco para OMAM.

Conclusão

A avaliação odontológica prévia ao uso de bifosfonatos é uma intervenção essencial e custo-efetiva na Atenção Básica para prevenir a osteonecrose dos maxilares. A atuação preventiva do cirurgião-dentista, associada à integração da equipe multiprofissional, promove um cuidado seguro, qualificado e integral ao paciente.

Resultados

A literatura evidencia que a eliminação de focos infecciosos (doença periodontal, lesões endodônticas, raízes residuais) e a adequação de próteses antes de iniciar os bifosfonatos reduzem drasticamente o risco de OMAM. Na Atenção Primária, as condutas fundamentais consistem em:

1. Anamnese criteriosa: Mapeamento de medicações em uso ou com indicação futura.


2. Adequação do meio bucal: Realização de procedimentos invasivos necessários com tempo hábil de cicatrização (14–30 dias) antes da primeira dose do fármaco.

3. Educação e higiene: Orientação sobre higiene bucal rigorosa e controle de placa.

4. Trabalho interdisciplinar: Articulação entre médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas para o encaminhamento oportuno antes da prescrição medicamentosa.

5. Encaminhamento direcionado: Casos suspeitos ou de maior complexidade devem ser referenciados à Atenção Especializada (CEO/CTBMF) com prioridade.

6. A Equipe de Saúde Bucal da UBS Jardim Comercial identificou dois casos de OMAM e realizou o encaminhamento como priorização de caso clínico para o Centro de Especialidade Odontológica de Referência.



Acesse o trabalho
na íntegra!

